

Heroin

BIG H, BLACKTAR, BROWN SUGAR, DOPE, HORSE, JUNK, MUD, SKAG, SMACK

HEROIN Made from the opium poppy plant, heroin can be smoked, snorted or injected. Injecting heroin causes the most overdoses and the effect is more immediate and more powerful. Injecting heroin also makes you more likely to become addicted.

Heroin affects the parts of your brain and nervous system that control your mood, breathing and how you feel pain. When you do heroin you feel a rush right away and then you feel very calm and sleepy. People say it's like a warm fluid feeling in your body—your mind feels detached and then your limbs get really heavy. Following the initial rush you become both wakeful and drowsy at the same time or 'on the nod.' Your thinking becomes clouded and your speech will be slow and slurred.

The worst part of using heroin is getting hooked. After using it for a while you have to use more to keep from going through withdrawal. People who are addicted get 'sick' if they don't get more heroin. The symptoms of heroin withdrawal are diarrhea, nausea, stomach pains, muscle aches, sweating, hot and cold flashes and exhaustion.

Using heroin over a long period of time will leave you prone to liver disease, pneumonia and other pulmonary issues, collapsed veins and infections of the heart lining. There is also a chance of getting really sick from what has been added to the heroin.

Injecting heroin and not taking precautions can lead to HIV, hepatitis and other infections such as septicemia (blood poisoning), endocarditis (heart infection), necrotizing fasciitis (flesh-eating disease), wound botulism, tetanus and abscesses.

Reduce your risk of overdose by not mixing heroin with other drugs or alcohol on the same day and not injecting alone.

For more information call 303.369.0039 x245
www.ImprovingHealthColorado.org
www.LinkinCare.org



Heroína

CABALLO, CRUZ BLANCA, H, BLANCO, BREA

Echa de la planta de amapola, la **HEROÍNA** puede ser fumada, inhalada, o inyectada. Inyectar heroína causa la mayoría de las sobredosis y como la mayoría las drogas el efecto es más rápido y más fuerte. Inyectar heroína hace que te vuelvas adicto más rápido.

La heroína afecta las partes del cerebro y sistema nervioso que controla tu ánimo, respiración, y como sientes dolor. Cuando usas heroína sientes sus efectos inmediatamente. Después te sientes calmado y adormecido. Se dice que las personas sienten un fluido tibio en el cuerpo y la mente se disipa y después tus extremidades se ponen pesadas. Inmediatamente después que pasan sus primeros efectos te sientes despierto y con letargia al mismo tiempo, o cabeceas. Tu pensamiento se vuelve confuso, hablas lento y balbuceas.

La peor parte de usar heroína es volverte adicto. Después de usarla un tiempo tienes que seguir usándola para evitar las reacciones fuertes del cuerpo. La gente se enferma cuando no tienen más heroína. Los síntomas cuando dejas de usar heroína son diarrea, náuseas, dolor de estómago, dolor de los músculos, transpiración, escalofríos, y agotamiento.

Cuando se usa por largo tiempo te deja predisuesto a enfermedades del hígado, problemas pulmonares incluyendo neumonía, problemas con las venas, infecciones de los tejidos cardiovasculares y celulitis.

Inyectarse heroína sin tomar precauciones puede causar HIV, hepatitis, y otras infecciones tales como septicemia (envenenamiento de la sangre), endocarditis (infección cardíaca), necrotizante fasciitis (enfermedad que coré la piel) heridas por botulismo, tétanos, abscesos. Disminuye los riesgos de sobredosis y no mezcles heroína con otras drogas el mismo día y no lo hagas solo.